

Wichtige Information

für alle Patienten mit **Colitis ulcerosa, Morbus Crohn** oder auch **Magen-bzw. Zwölffingerdarmgeschwüren**.

Bei den o.g. Diagnosen ist es außerordentlich wichtig, daß sie folgende Medikamente, egal aus welchen Gründen, **nicht** einnehmen:

- alle Medikamente, die Acetylsalicylsäure auch in geringer Dosierung enthalten, wie z.B. Aspirin, Thomapyrin und zahllose andere Medikamente, bitte daher zunächst im Beipackzettel nach Wirkstoffen suchen.
- auch andere nichtsteroidale Antirheumatika können sich für sie stark schädigend auswirken: Diclofenac (z.B. Voltaren), Ibuprofen, Naproxen, Indometacin, Ketoprofen, Piroxicam, Meloxicam und viele andere.

Bei Schmerzen können Sie ohne Probleme und ohne Gefahr der Verschlechterung Ihrer Krankheit zwei Tabletten Paracetamol 500mg oder 2 Tabletten Metamizol 500mg einnehmen. Als stärkeres Schmerzmittel hat sich auch Tramadol retard zur Nacht bewährt.

Bei starken rheumatischen Beschwerden sind Präparate wie Arcoxia oder Celebrex in Ausnahmefällen zulässig.

Zur "Blutverdünnung" gibt es auch alternative Mittel wie Ticlopidin, Clopidogrel u.a. Diese Frage müssen Sie eventuell mit Ihrem Hausarzt, Kardiologen oder Neurologen klären.